HOJA
Abies sp.



Referencias: A-C.T. B-Esquema: 1.conducto o canal resinífero esquizógeno, 2.epidermis esclerificado, 3.hipodermis, 4.estoma cámara frontal, células de cierre y cámara subestomática, 5.clorénquima esponjoso, 6.endodermis a veces con almidón, 7.tejido de transfusión formado por células parenquimáticas almacenadotas y por traqueadas de pared delgada, 8.haz vascular xilema y floema.

HOJA
Picea sp.



Referencias: A-C.T. hoja B-Esquema: 1.epidermis, 2.hipodermis, 3.estoma, 4.clorénquima, 5.endodermis, 6.tejido de transfusión, 7.haz vascular.

.

HOJA

Pinus sp.



Referencias: A-C.T. B-Esquema: 1.epidermis esclerificada, 2.hipodermis fibrosa, 3.canal resinífero esquizógeno, 4.mesófilo, 5.estoma, 6.endodermis amilácea, 7.tejido de transfusión, 8.haz vascular.

HOJA
Poa sp.





Referencias: A-C.T. B-Esquema: 1.epidermis, 2.estoma, 3.clorénquima, 4.viga de esclerénquima, haz colateral cerrado.

HOJA

Colocasia sp.





Referencias: A-C.T. B-Esquema: 1.epidermis, 2.estoma, 3.clorénquima en empalizada, 4.clorénquima con cámaras aeríferas, 5.vaina parenquimática del haz, 6.haz vascular, 7.casquete subepidérmico de esclerénquima, 8.células hidioblásticas con drusas.

HOJA

Monstera sp.



Referencias: A-C.T. B-Esquema: 1.epidermis, 2.clorénquima en empalizada, 3.clorénquima esponjosa, 4.vaina del haz, 5.haz vascular, 6.tricoesclereidas, 7.drusas.

HOJA

Lilium sp.





Referencias: A-C.T. B-Esquema: 1.epidermis, 2.estoma, 3.clorénquima en empalizada, 4.clorénquima esponjoso, 5.vaina del haz, 6.haz vascular colateral.

HOJA

Sisyrinchium sp.





Referencias: A-C.T. B-Esquema: 1.epidermis, 2.estoma, 3.clorénquima en empalizada, 4.clorénquima esponjoso, 5.haz vascular, 6.cámara con células parenquimáticas lisadas. Hoja unifacial.

HOJA

Ficus sp.





Referencias: A-C.T. B-Esquema: 1.epidermis, 2.mesófilo en empalizada y esponjoso, 3.litociste con cristal pedicelado de COCa. (cistolite), 4.vaina del haz, 5.haz vascular con casquete de fibras floemáticas.

HOJA

Nymphaea sp.





Referencias: A-C.T. B-Esquema: 1.epidermis, 2.estoma, 3.mesófilo en empalizada y esponjoso, 4.haz vascular con vaina de naturaleza parenquimática, 5.astroesclereida.

HOJA

Sedum sp.





Referencias: A-C.T. B-Esquema: 1.epidermis, 2.estoma, 3.haz vascular, 4.mesófilo homogéneo.

HOJA

Scutia sp.



Referencias: A-C.T. B-Esquema: 1.epidermis, 2.litociste, 3.mesófilo (empalizada, esponjoso-empalizada), 4.haz vascular con vaina parenquimática, 5.nervio medio con grupos de fibras frente al polo de xilema y cordón subepidérmico de colénquima laminar adaxial.

HOJA

Rapanea sp.





Referencias: A-C.T. B-Esquema: 1.epidermis, 2.mesófilo (empalizada y esponjoso), 3.haz vascular anficribal con anillo de fibras perifloemáticas.

HOJA

Nerium sp.





Referencias: A-C.T. B-Esquema: 1.epidermis, ppluriestratificada, 2.cripta, 3.mesófilo (empalizada y esponjoso), 4.N estomas en cripta, 5.haz vascular colateral con vaina parenquimática, 6.colénquima laminar, 7.pelos unicelulares. Hoja dorsivental o bifacial hipostomática.

HOJA

Ligustrum sp.





Referencias: A-C.T. B-Esquema: 1.epidermis, 2.mesófilo (empalizada y esponjoso), 3.haz vascular, 4.colénquima laminar.

HOJA

Syringa sp.





Referencias: A-C.T. B-Esquema: 1.estoma, 2.epidermis, 3.mesófilo (empalizada y esponjoso), 4.colénquima laminar, 5.haz vascular colateral con vaina parenquimática.